

## 手术前应该避免使用的血液稀释剂

某些药物会使血液稀释。由于这些药物会防止血液凝结，您在手术前可能需要停用这些药物。

### 注意事项



如果您正在使用阿司匹林、抗血小板药物或血液稀释剂，在征求开药医生或心脏科医生的意见之前，不要停止用药。如果您无法与医生取得联系，请与 MD Anderson 的手术团队沟通。您也可以致电 **PeriOperative Evaluation and Management Center**（手术评估与管理中心）的护士，电话 **713-792-6133**。

在没有医生监控的情况下，**不要**停药。自行停药可能会给您带来危险。

请告诉医生您近期正在或已经服用的所有药物。包括处方药、非处方药、营养补品、维他命、矿物质补充剂和草药产品，即使不属于下列内容也要告诉医生。您的医生或护士会告诉您应该避免哪些药物。

以下列出的仅是可以影响血液凝结的药物的一部分。

### 抗血小板制剂

- Clopidogrel (Plavix<sup>®</sup>)
- Cilostazol (Pletal<sup>®</sup>)
- Dipyridamole (Persantine<sup>®</sup>, Aggrenox<sup>®</sup>)
- Prasugrel (Effient<sup>®</sup>)
- Ticagrelor (Brilinta<sup>®</sup>)
- Ticlopidine (Ticlid<sup>®</sup>)

### 注射用血液稀释剂

- Dalteparin (Fragmin<sup>®</sup>)
- Enoxaparin (Lovenox<sup>®</sup>)
- Fondaparinux (Arixtra<sup>®</sup>)
- Tinzaparin (Innohep<sup>®</sup>)

### 抗凝剂

- Apixaban (Eliquis<sup>®</sup>)
- Dabigatran Etexilate (Pradaxa<sup>®</sup>)
- Edoxaban (Savaysa<sup>®</sup>)
- Lepirudin (Refludan<sup>®</sup>)

- Rivaroxaban (Xarelto<sup>®</sup>)
- Warfarin (Coumadin<sup>®</sup>)

## 非处方药和草药产品

- Aspirin
- Ephedra/Ma Huang<sup>®</sup>
- 鱼油
- 人参
- 骨胶原/软骨素
- 大蒜
- 银杏
- Ibuprofen (Motrin<sup>®</sup>, Advil<sup>®</sup>, Nuprin<sup>®</sup>)
- Naproxen (Anaprox<sup>®</sup>, Aleve<sup>®</sup>, Naprosyn<sup>®</sup>)
- 圣约翰草